

IPARI ENZIMEK



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

IPARI ENZIMEK

Történelem, mérföldkövek

Ósrégi: borjúgyomor – tejalvasztó enzim, rennin
maláta – keményítőtőbontó enzimek, amilázok

1836 Schwann: pepszin a gyomornedvből (triviális név)

1876 Kühne: enzim elnevezés (de még nem tudták pontosan, hogy mi az)

1890 TAKAMINE (USA) „takadiasztáz” preparátum *Asp. oryzae*, emésztés-segítő, proteáz + amiláz

1894 E. Fischer: sztereo-specifitás, α és β glükózidázok

1913 Michaelis-Menten: enzimkinetika v_{max} , K_M

1926 Sumner: kristályos enzim, ureáz kardbabból

1966 teljes térszerkezet, lizozim



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

2

IPARI ENZIMEK

Történelem, mérföldkövek

1969 Enzimek és sejtek immobilizálása
1969 DL-Met reszolválása, Tanabe, J
1973 6-amino-penicillánsav előállítás

1974 xilóz izomeráz – High Fructose Corn Syrup

1977 laktáz – low lactose milk

1975 Kliganov: enzimreakció szerves fázisban – lipáz

1999 Enzyme Data Bank: ~4000 emzim, www.expasy.ch



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

3

ENZIMEK ALKALMAZÁSAI

Ipar: amilázok, proteázok, izomerázok, penicillin aciláz, konverziók (pl. az eddigi előadásokban felsoroltak)
Piac: ~2000 MUSD/év

Analitika, diagnosztikumok: glükóz-oxidáz, alkohol dehidrogenáz, koleszterin oxidáz, ... stb

Medicina: proteázok, lipáz, aszparagináz, sztreptokináz, heparináz, ... stb
Piac: ~3000 MUSD/év

Kutatás/génmanipuláció: restriktációs endonukleázok, reverz transzkriptáz, DNS-ligáz, DNS polimeráz,


Mi itt az ipari enzimekkel foglalkozunk.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

4

MEGOSZTLÁS IPARÁGAK SZERINT



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

5

IPARI ENZIMEK PIACA

Néhány multi uralja:

Novozymes (DK)
DuPont/Danisco (USA)
Roche (CH)

USA 40 %
Európa 35 %
Japán 24 %

Enzyme	Sales (% of total)
Bacillus proteázok	45
Glükamilázok	13
Bacillus amilázok	5
Glükóz izomerázok	6
Rennin (mikrobiális)	10
Amilázok (penész)	4
Pektinázok	3
Proteázok (penész)	2
Egyéb	12



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

6

IPARI ENZIMEK FORRÁSAI

- Állati szövetek:
 emésztőcsatorna emésztőenzimei: tripszin, rennin
 májból: glutamát dehidrogenáz
- Növényi eredetű:
 Papain, bromelin
 α és β-amilázok: malátában
- Mikroorganizmusok:
 Sok extracelluláris hidroláz
 Egyenértékű vagy jobb enzimet termelnek.
- Ma a termelt enzimek 60%-a nem természetes, vagy
- génmanipulációval átvitték egy másik mikroorganizmusba
 - protein engineering-gel megváltoztatták a szerkezetét.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

7

IPARI ENZIMEK TERMELÉSE

- Anyagcsere: egyetlen fehérjét kell termelni nagy mennyiségben.
- Szabályozások: néhány konstitutív enzimtől eltekintve ezek induktív enzimek → indukálni kell → általában a szubsztráttal
- Amilázok - keményítővel
 - Invertáz - szacharózzal
 - β-galaktozidáz - laktózzal
 - Glükóz-izomeráz - xilózzal (xilán, korpa)
- Katabolit represszió: a bőséges cukor (glükóz, fruktóz, stb) lefékezi az alternatív anyagcserét. Kivédése:
- más, nehezen hozzáférhető szénforrás (laktóz, glicerín, ...)
 - glükóz adagolással limitben tartani
 - szabályozási mutánsok keresése



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

8

IPARI ENZIMEK TERMELÉSE

- Tenyésztés általános jellemzői:
- Felületi: még előfordul – tálca, forgó dob
- Szubmerz: általános
- Szakaszos: tisztán ritkán fordul elő
 - Rátáplálásos: a leggyakoribb
 - Folytonos: ahol csak lehet
- Oxigén ellátás: nincs általános szabály
- van, ahol az oxigén limit a jó (pl. glükóz izomeráz,...)
 - van, ahol nagy OUR szükséges (pl. proteáz, ...)
 - van ahol +8% CO₂ bevezetése előnyös



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

9

IPARI ENZIMEK TERMELÉSE

Feldolgozás jellemző műveletei:
Extracelluláris – intracelluláris enzimek (sejtfeltárás)
(a cél az extracelluláris, pl. génmanipulációval egy szignálpeptidet kapcsolnak a fehérje elejére)
Kicsapás - kicsőzés, oldószeres kicsapás (IEP)
Ultraszűrés – koncentráls, diaszűrés
Kromatográfia – ioncsere, adszorpciós, néha affin- és gél-
Szárítás – fluid ágyas, porlasztva szárító, dobszáritó
Granulálás – extruderrel, sima felületű gyöngyök, por nélkül

A két utolsó lépés drága, és árthat az enzimnek, ezért sok-szor inkább oldatban hozzák forgalomba (stabilizálás)



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

10

IPARI ENZIMEK

Az ipari léptékben termelt enzimek szinte mind hidrolázok. Ezen belül a szubsztrátok szerint célszerű csoportosítani az egyes készítményeket.


- Szénhidrátbontó enzimek (ezeket itt nem tárgyaljuk, mert párhuzamosan a keményítőipar kapcsán tananyag)
- Proteázok (pH optimumuk szerint lúgos, semleges és savas proteázok)
- Lipázok



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

11

Proteázok



A proteázok az ipari enzimek egyik legfontosabb csoportja (6200 t tiszta enzimfehérje/év)
Peptid kötések bont (létrehoz) (hidrolízis, szintézis)
Fehérje lebontás: élelmiszer, tejelválas, mosóenzimek, infúzió, vérrögoldás (fibrin oldás)
Peptid szintézis: aszpartám előállítás



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

12

Proteázok

Hidrolízis-ekvivalens (h):
(mól elbontott peptidkötés)/(kg fehérje (szubsztrát))

Hidrolízis fok (DH = degree of hydrolysis), bontási százalék:

$$DH = \frac{h}{h_{tot}} \cdot 100\%$$

(mól elbontott peptidkötés)/(mól összes peptidkötés)

h_{tot} = 1 kg fehérjében található összes peptidkötés (mól).
Ez ~8 mól/kg, mert ha az aminosavak átlagos molekula-
tömege 125 g/mol, akkor 1 kg fehérjében 8 mól aminosav =
8 mólnyi peptidkötés van.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

13

Proteázok

Csoportosítás:

- Exo- és endoproteázok
- termelő szervezetek alapján (baktérium, gomba)
- pH optimum alapján (alkalikus, neutrális, savas)
- kulcs-aminosav szerint (Ser, Cys, Asp proteázok)



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

14

Alkalikus proteázok

Termelő mikroorganizmusok:
Streptomyces nemzetség, *Aspergillus* nemzetség, *B. amy-
loliuefaciens* (szubtilizint termel – szerin-proteáz, reverzi-
bilis a hidrolízis)

A **mosószer** proteázoknál feltétel a kompatibilitás:

- detergensekkel
- lúgokkal
- kelátképzőkkel
- perborátokkal
- hőstabilitás



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

16

Alkalikus proteázok a bőriparban

Bőrkikészítés:

- Tartósítás
- **Áztatás** – proteázokkal leemésztik a nem-rost fehérjéket
- **Szőrtelenítés** – az enzimek nem a szőrt (keratint) bontják, hanem a szőrtüszőt
- Zsírtalanítás
- Pácolás
- Cserzés



BME

Törzsek

Screening

pH = 10-es fehérje agaron szélesztéssel

Törzsjavítás (génmanipuláció, protein engineering)

Célja: az adott törzs több enzimet termeljen

- 1.) erős promótert teszünk az adott gén elé
- 2.) multikópiás plazmid: az adott gén több példányban legyen jelen.
- 3.) protein engineering: pl.:a stabilitás érdekében a 222 Met-t (amitől egy fehérje általában instabil) Ser-re cserélték - jobb aktivitást tapasztaltak, de a stabilitás nem lett jobb.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

18

Fermentációs technológia

- Fed batch fermentáció
- Az NH₄ és aminosav koncentrációt alacsonyan kell tartani
- intenzív O₂ bevétel kell
- 48-72 h


1971-ben termék-krisis: a por állagú enzim a gyár levegőjében szállva a dolgozóknál erős allergiát okozott.
Megoldás: mikrokapszulázás, extruder granulálás – sima felületű szemcsék, nem porzik.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

19

Egy alkális proteáz gyártási technológia



Neutrális proteázok

- Termelő mikroorganizmusok:
Bacillus subtilis, *S. griseus*, *Aspergillus oryzae*
- Érzékeny: - hőre
- stabilizátorokra (CaCl_2 , NaCl)
- alkális proteáz gyorsan lebontja
- Felhasználás:
- Élelmiszeriparban
 - Bőriparban



Neutrális proteázok a sütőiparban

- A sütőiparban: elbontják a sósó fehérjét, ezzel
- Enyhe bontásnál a tészta lazább lesz, nagyobbak a buborékok
 - Erősebb bontásnál a tészta nem rugalmas lesz, hanem kemény, roppanós (keksz, ropi)
 - Több szabad aminos csoport keletkezik – Maillard reakció – barna szín



Neutrális proteázok húsiparban

A húsiparban: érlelés, fehérje rostok fokozatos lebontása (rágós → puha)

- Spontán, saját enzimekkel +4 fokon 2-3 hét
- Felgyorsításához proteázt injektálnak
- Hidegen ez is lassan megy, de a sütés/főzés során felgyorsul a folyamat



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

23

Savas proteázok

Asp és Glu proteázok

Pepszin típusú: $pH_{opt} = 2-4$, *Aspergillus*-ok termelik
Rennin típusúak: $pH_{opt} = 5-7$, *(Rhizo)mucor*-ok termelik

Felhasználás:

- emésztést elősegítő enzimek (pepszin pótlása)
- szója hidrolízis, szója szósz előállítása
- tej alvasztása



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

24

Oltóenzim, rennin, rennet, chymosin

Savas proteáz

A sajtgyártás kulcsenzime, alvasztó enzim, Asp van az aktív centrumban (= aszparaginsav proteáz)

A 3-4 hetes borjú gyomrában található pre-pro-chymozin formában.

Két izoenzime van, egy aminosav (244) különbség:
- *chymozin A*: Asp (~40%, nagyobb az aktivitás)
- *chymozin B*: Gly (~60%)


Genetikailag meghatározott, vagy A vagy B van termelődik.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék


25

Chymosin-B



 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 26

Az aktív kimozin kialakulása



 27

Kimozin

Megnövekedett igény, nincs elég borjú gyomor.

A hiányzó mennyiség pótlására:

1. állati (pl. csirke) pepszinek (Izrael, Csehország)
2. savas penész proteázok - *Rhizomucor miehei*, *R. pusillus*, *Cryphonectria (Endothia) parasitica*

E. parasitica enzim: kereskedelmi készítmény, 1967, Supraren (USA, Franciaország)

- pH = 4 - 5,5
- hőstabilitása (viszonylag) nagy (itt hátrány)
- extracelluláris enzim, kicsapódhat

Protein engineering-gel próbálták javítani.

 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 28

Rekombináns kimozin

3. Rekombináns DNS technikával

E. coli

- 1980 elején az állati chymozin gént klónozták, REN-NET[®] néven szabadalmaztatták és engedélyeztették
- az enzim oldhatatlan, zárványtest (inclusion body) formában van
- az összfehérje 15-20%-a rennin

B. subtilis: ártalmatlan mikroba, de ez is intracelluláris

Saccharomyces cerevisiae: gyenge termékképzés



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

29

Rekombináns kimozin

Aspergillus niger var. awamori törzssel

Egyszerű inokulálás, spórákkal, hosszabb, egy hetes fermentáció.

Extracelluláris, könnyű feldolgozni, de: a komplex tápoldat miatt szennyezettebb.

Elég porlasztva szárítani, ha tiszta enzim kell, akkor oszlopokon tisztítják.

Christian Hansen, (CHY-MAX); Genencor (CHYMOGEN)



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

30

Rekombináns kimozin

Kluyveromyces lactis-sal: élelmiszeripari mikroba, tejsavóból izolált élesztő, a tejcukrot bontja (vö.: SCP gyártás),

A tejiparban használatos β -galaktozidázt ezzel termeli a Gist-Brocades.

Extracelluláris enzimtermelés: az élesztő α -faktor leadert, mint szignál szekvenciát beépítették az N-terminálisra ezáltal a prochymosint extracellulárisan termeli. (1988 F, NL)

A törzs kevés más extracelluláris fehérjét termel, ezért könnyű a kimozint izolálni.

Prochymosin $\rightarrow$ chymosin (MAXIREN[®])

Jól ismert törzs, egyszerű a scale up.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

31

MAXIREN[®]

A termék nem tartalmazhat élő sejtet, ezeket benzooesavval alacsony pH-án előlik, és szűrik (ultraszűrés után sterilszűrés → élelmiszeripari enzim)
Közben a prochymosin → chymosin átalakulás végbemegy
A terméket benzooesavval tartósítják.

Régebben plazmidon elhelyezkedő génről termeltették a prochymosint, azután a prochymosin gént beépítették a kromoszómába.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

32

MAXIREN[®]

- tisztább, mint a borjú kimozin, nincs kísérő enzim (pepszin + egyéb)
- a kimozinnal kémiailag és biológiailag teljesen azonos
- termelése olcsó
- állandó tisztaságú, mentes állati szervmaradványoktól (pl. nincs BSE veszély)
- korlátlanul termelhető



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

33

MAXIREN[®]

- 1988-tól ipari termelés Seclinben (F), az üzem ISO 9002 minősítéssel rendelkezik rekombináns élesztő tenyésztésére, kóser minősítés, vegetáriánus minősítés.
- engedélyeztetése nehéz volt, csak
- DNS stabilitás, patogenitás, mutagenitás, toxikusság, etetési teszt, allergia, sajtgyártási teszt, organoleptikus vizsgálatok után fogadták el.
- EC, EU előírásait be kell tartani (termelésre és termékre egyaránt)




BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

34

A kimozin hatása

A sajtgyártás kulcslépése a tejfehérje megalvasztása.
A sajt az első termék, melynél enzimet és mikrobát (tejsavbaktériumot) is használnak évezredek óta.
Évente 25*10⁶ liter kimozint forgalmaznak, 140 M USD értékben, olcsó enzim.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

36

A tej fehérjei

Fehérjék	%	Foszfát csoportok molekulánként	
Kazein			
α s1-kazein	32	8	Hőstabil P miatt, Ca kötő micella képz.
α s2-kazein	8	10-13	
β-kazein	32	5	
κ-kazein	8	1-2	
	80		
Savó fehérjék			
β-laktoglobulin	12	0	Ezek ultraszűréssel eltávolíthatók
β-laktalbumin	4	0	
Immunglobulin	3	0	
Szérum albumin	1	0	
	20		




BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

37

Kazein micellák

0,1% Ca jelenlétében a kazeinok micellát képeznek.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

38

A kimozin hatása

 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 39

A kimozin hatása

1. fázis: A rennin fenilalanin-metionin között végez hasítást, kettévágja a κ -kazeint és ezzel destabilizálja a micella szerkezetét.

2. fázis: koaguláció, mely a magasabb hőmérsékleten és Ca^{2+} ionok hatására fokozódik

Szétválasztás: túró (fehérje: a 8%-ból 7, zsír, Ca, foszfát) + savó (tejcukor ~7,5% és ~1% fehérje, ásványi sók)

 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 40


Sajtérlelés

Bizonyos sajtokat érlelnek (4 hét-2 év), az idővel a víztartalom csökken.
Közben kémiai, biokémiai, mikrobiológiai változások zajlanak le.

- ha tejcukor maradt a sajtban és ezen a mikrobák elszaporodnak → kellemetlen íz
- sok szabad zsírsav keserű (szappanszerű) ízt ad
- a fehérje bomlás folyamatos, aminosavak, biogén aminok, ammónia

 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 41

termolizin Zn proteáz, az aszpártám gyártás enzime
Aszpártám: mesterséges édesítőszer.
Felhasználása élelmiszereknél: italok, tej, jam, cukorkák...
A fenilalanin metil észterének és aszparaginsavnak az
összekapcsolásával keletkezik:




Enantiomer tisztaság: 99,99 %



Aszpartám gyártás

Ahhoz, hogy csak a fenilalanin aminocsoportja reagáljon az aszparaginsav α -karboxil csoportjával, a rajtuk lévő egyéb funkciós csoportokat blokkolni kell, egyébként random di- és oligopeptidek képződnek.




BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

45

Aszpartám gyártások


Kémiai eljárás (formilezés, NutraSweet, Ajinomoto):



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

46

Enzimes eljárás (HSM = Holland Sweeteners Company)



A Phe metilésztere a karbonsavat blokkolja, az Asp aminos-csoportját pedig egy benzoi-oxi-karbonil (BOC) csoporttal védik (ez végül hidrogénezéssel eltávolítható).



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

47

Enzimes eljárás (HSM)

- Az enzimes eljárás előnyei:
- Nem keletkezik β-aszpartám (ami keserű)
 - Sztereoszelektív a reakció, csak L-aszpartám keletkezik, így alapanyagként DL-Phe (racém, olcsóbb) is használható.
 - Nincs racemizáció a szintézis alatt
 - A reakció vizes közegben, enyhe körülmények között végrehajtható.
 - A keletkező védett aszpartám adduktot képez a feleslegben lévő D-PheOMe-rel, ami kicsapódik.
 - A termék kicsapódása miatt az egyensúlyinál jobb konverziót lehet elérni (5% → 90%).



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

48

Az enzimes aszpartám gyártás lépései


- Szubsztrátok:
- L-aszparaginsav + DL-fenilalanin-OMe (racém, olcsóbb)
- A keletkező védett aszpartám adduktot képez a feleslegben lévő D-PheOMe-rel, ami kicsapódik.
 - Szűrés
 - Sósavval visszaoldják.
 - A BOC csoportot lehidrogénezik, a D-PheOMe-t racemizálják és visszaviszik a folyamat elejére.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

49


Aszpartám gyártás



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

50

Az aszpartám gyártás folyamatábrája




BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

51

Lipázok

Alapreakció: a zsírok észterkötéseit hidrolizálják, termékek: szabad zsírsavak, mono- és digliceridek, glicerín.
Egyensúlyi reakció, visszafelé is megy.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

52

Lipázok

Vannak régióspecifikusak, amelyek csak a szélső zsírsavakat hidrolizálják, a középsőt nem, de vannak erre érzéketlenek is. A szénlánc hossza csak a sebességet befolyásolja.
Szerves oldószerekben is jól működnek, igen kis víztartalom mellett.
Sőt a hőállóságuk is jobb ebben a közegben →70 °C.
Adszorpcióval könnyen immobilizálhatóak szerves és szervetlen hordozók felületén (hidrofil-hidrofób jelleg a használt oldószer szerint).



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

53

Lipázok

Termelő mikroorganizmusok:

➤ *Aspergillus* nemzetség,

➤ *Mucor* nemzetség,

➤ *Rhizopus* nemzetség,

➤ *Candida* nemzetség

Általában sejthez kötött enzimek, de Mg^{2+} ionok hatására leválnak

Induktor: olaj, zsírok (szubsztrát),
Represszor: glükóz (katabolit represszió), glicerín (termék inhibíció)

 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

54

Lipázok felhasználása

1. Emésztést elősegíti (pankreász lipáz pótlása)

2. Sajtérlelésben ízjavító (tejsír irányított bontása)

3. Szappan ipar, kéméletes elszappanosítás (*Candida* lipáz)

4. Átészterezés, észterképzés → dinamikus egyensúly → a karbonsav csoportok folyamatosan cserélődnek →

 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

55

Zsírok átészterezése

1. Trigliceridek között

$$n \begin{matrix} \text{OCOR}_1 \\ \text{OCOR}_2 + m \\ \text{OCOR}_3 \end{matrix} \begin{matrix} \text{OCOR}_4 \\ \text{OCOR}_5 \\ \text{OCOR}_6 \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} \text{OCOR}_1 \\ \text{OCOR}_2 \\ \text{OCOR}_4 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{OCOR}_4 \\ \text{OCOR}_2 \\ \text{OCOR}_6 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{OCOR}_3 \\ \text{OCOR}_5, \text{ etc} \\ \text{OCOR}_6 \end{matrix}$$

2. Triglicerid és zsírsav között

$$n \begin{matrix} \text{OCOR}_1 \\ \text{OCOR}_2 \\ \text{OCOR}_3 \end{matrix} + m\text{RCOOH} \longrightarrow \begin{matrix} \text{OCOR} \\ \text{OCOR}_2 \\ \text{OCOR}_3 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{OCOR}_1 \\ \text{OCOR} + \text{R}_1\text{COOH} + \text{R}_2\text{COOH} \\ \text{OCOR}_3 \end{matrix}$$

 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

56

Kakaóvaj-pótló anyag előállítása


Pálmamag-olaj átészterezése kakaóvajszerű zsiradékká (csokoládé gyártás)

Triglyceride	Palm oil mid-fraction (% dry weight)	Enzymically produced fat (% dry weight)	Cocoa butter (% dry weight)
SiSiSt	5	3	1
POP	58	16	16
POSt	13	39	41
SiOSt	2	28.5	27
StLnSt	9	8	8
SiCO	4	4	6
Others	2	1.5	1



Kakaóvaj-pótló anyag előállítása


Napraforgóolaj átészterezése kakaóvajszerű zsiradékká (csokoládé gyártás) *régió-szelektív* lipázokkal.



A termékből a szabad savakat eltávolítják molekuláris desztillációval, azután hűtéssel frakcionált kristályosítás: a sztearinsav észterek válnak ki először, az olajsavasok folyékonyak maradnak.




Kakaóvaj-pótló anyag előállítása



Növényolaj átészterezése biodízzellé


A biodízel gyártása során a növényi olajat átészterezik metilészterré. Ezt KOH-val végzik, de dolgoznak az enzimikus technológián. Ehhez *nem-régióspecifikus* lipáz szükséges.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

60

Növényolaj átészterezése biodízzellé



Sok (~12%) glicerín keletkezik



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

61